





Badania w ciąży

**Nie wiesz, jak odczytać wyniki badań?
Zastanawiasz się, jakie jeszcze
badania wykonać?**

- wykonałaś test Papp-a
i nie wiesz jak go zinterpretować
- wykonałaś test NIFTY lub inny tego
rodzaju test i nie wiesz, jak odczytać wynik
- masz nieprawidłowe wyniki testu Papp-a
lub testu potrójnego i nie wiesz co dalej robić
- badanie USG wykazało nieprawidłowości
i lekarz zalecił wykonanie dodatkowych badań
- planujesz amniopunkcję, ale wahasz się,
czy jest to konieczne
- w poprzedniej ciąży urodziłaś dziecko
z zespołem Downa lub inną chorobą genetyczną
- w Twojej rodzinie lub rodzinie partnera
wystąpiła choroba genetyczna

Jak skorzystać
z pomocy
GENETYKA ?

 OSOBIŚCIE W PORADNI GENETYCZNEJ	 KONSULTACJA PRZEZ TELEFON
--	--

Rejestracja – od poniedziałku do niedzieli w godzinach **8.00 do 21.00**
Zadzwoń pod numer **793-300-341** aby ustalić szczegóły

Pomocy udziela
dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek
Genetyk, diagnostyk z kilkunastoletnim
doświadczeniem i bardzo dobrymi opiniami
ze strony pacjentów.



Sprawdź opinię na znanylekarsz.pl ★★★★★

testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

- www.poradagenetyka.pl ul. Bocheńskiego 38 A
- e-mail: genetyk@testdna.pl; (32) 445 34 26
- (32) 445 31 71, 793 300 341 (Przychodnia CenterMed)



testDNA 
laboratorium badań DNA

Dlaczego **warto** **porozmawiać** **z GENETYKIEM**

- ▶ uzyskasz rzetelną interpretację dotychczasowych wyników badań, testu Papp-a, potrójnego, NIFTY
- ▶ dowiesz się, czy zalecana amniopunkcja jest konieczna w Twoim przypadku
- ▶ dowiesz się, jakie badania powinnaś wykonać w sytuacji nieprawidłowych wyników USG
- ▶ dowiesz się o ryzyku urodzenia dziecka z zespołem Downa w kolejnej ciąży
- ▶ możesz uzyskać skierowanie na konkretne badania, które wykluczą nieprawidłowości w ciąży



Tylko **lekarz** **genetyk** jest w stanie:

- ▶ prawidłowo i bardzo dokładnie ocenić wynik danego badania analizując m.in. dane rodowodowe
- ▶ właściwie rozpoznać nieprawidłowości na podstawie wyników testu Papp-a i potrójnych lub testu NIFTY
- ▶ określić konieczność wykonania dodatkowych badań nawet przy prawidłowym wyniku amniopunkcji
- ▶ zaproponować odpowiednie badania, które wykluczą ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa przy następnej ciąży